



# Impfkalender

für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

Wir fürs Impfen

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten					Alter in Jahren			
	6	2	3	4	11–14	15–23	2–4	5–6	9–14	15–17
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	
Diphtherie		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	
Pertussis		G1	G2	G3	G4	N	N	A1	A2	
Hib H. influenzae Typ b		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N			
Poliomyelitis		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N		A1	
Hepatitis B		G1	G2 <sup>c</sup>	G3	G4	N	N			
Pneumokokken <sup>a</sup>		G1		G2	G3	N	Indikationsimpfung für Risikopatienten			
Rotaviren	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)							
Meningokokken C					G1 (ab 12 Monaten)		N			
Masern					G1	G2	N			
Mumps, Röteln					G1	G2	N			
Varizellen					G1	G2	N			
HPV Humane Papillomviren								G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N <sup>d</sup>
FSME Frühsommer-Meningoenzephalitis					Indikationsimpfung					
Influenza					Indikationsimpfung für Risikopatienten					

## Erläuterungen

**G** → Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)

**A** → Auffrischimpfung

**N** → Nachholimpfung  
(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

**a** → Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen

**b** → Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

**c** → Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

**d** → Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9 – 13 bzw. 9 – 14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) mit 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 13 bzw. > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 6 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

Quelle: Adaptiert nach Robert Koch-Institut(RKI), Epidemiologisches Bulletin 34/2016