



# Impfkalender

## für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Wir fürs **Impfen**

Impfungen	Säuglinge und Kleinkinder (Alter in Monaten)						Kinder und Jugendliche (Alter in Jahren)					Erwachsene (Alter in Jahren)		
	6 Wochen	2	U4 3	4	U6 11-14	U7 15-23	2-4	U9 5-6	J1 9-14	15-16	17	ab 18	ab 60	
<b>Tetanus</b>						N	N	A1	A2	N		A (ggf. N) <sup>e</sup>		
<b>Diphtherie</b>			G2			N	N	A1	A2	N		A (ggf. N) <sup>e</sup>		
<b>Keuchhusten</b> Pertussis						N	N	A1	A2	N		A (ggf. N) <sup>e</sup>		
<b>Hib</b> Haemophilus Influenzae Typ b		G1		G3	G4	N	N							
<b>Kinderlähmung</b> Poliomyelitis			G2 <sup>c</sup>			N	N		A1	N		ggf. N		
<b>Hepatitis B</b>						N	N							
<b>Pneumokokken<sup>a</sup></b>		G1		G2	G3	N	Indikationsimpfung für Risikopatienten					S <sup>g</sup>		
<b>Rotaviren</b>	G1 <sup>b</sup>	G2	(G3)											
<b>Meningokokken C</b>						G1 ab 12 Monaten		N			Indikationsimpfung für Risikopatienten			
<b>Masern</b>						G1	G2	N			S <sup>f</sup>			
<b>Mumps, Röteln</b>								N						
<b>Windpocken</b> Varizellen						G1	G2	N						
<b>Grippe</b> Influenza							Indikationsimpfung für Risikopatienten					S (jährlich)		
<b>Gebärmutterhalskrebs</b> HPV								G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N <sup>d</sup>				
<b>FSME</b> Frühsommer-Meningoenzephalitis							Indikationsimpfung ab 12 Monaten							

### Erläuterungen

U › Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Kinder

J › Überlappungen mit Früherkennungsuntersuchung Jugendliche

G › Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1–G4)

A › Auffrischimpfung

S › Standardimpfung

N › Nachholimpfung (Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a › Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

b › Die erste Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

c › Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffs kann diese Dosis entfallen.

d › Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9–14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen erster und zweiter Dosis ist eine dritte Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

e › Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw., bei entsprechender Indikation, als Tdap-IVP-Kombinationsimpfung.

f › Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

g › Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

Quelle: Adaptiert nach Robert Koch-Institut (RKI), Epidemiologisches Bulletin 34/2018

Stand: August 2018