

Impfkalender 2026

Standardimmunisierungen für Säuglinge, Kleinkinder, Jugendliche und Erwachsene

Impfung/ Immunisierung	Alter in Wochen			Alter in Monaten										Alter in Jahren									
	0	4	6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–11	12–14	15–16	17	18–59	60–74	ab 75	
	U2	U3	U4	U5	U6							U7	U7a/ U8	U9	U10	U11	J1		J2				
Respiratorische Synzytial-Viren	mAk (Einmaldosis) Je nach Geburtsmonat ^a																						S ^m
Rotaviren			G1 ^b	G2	(G3)																		
Tetanus ^c																							
Diphtherie ^c														A1			A2					A ^h	
Pertussis ^c																				A3 ^h			
Hib– <i>H. Influenzae</i> Typ b ^c				G1		G2		G3 ^f															
Pollomyelitis ^c																	A1						
Hepatitis B ^c																							
Pneumokokken ^{c,d}				G1		G2		G3 ^f														S ⁱ	
Meningokokken B ^e				G1		G2			G3 ^f														
Masern								G1			G2									S ⁱ			
Mumps, Röteln																							
Windpocken <i>Varizellen</i>								G1			G2												
HPV– <i>Humane Papillomviren</i>																	G1 ^g / G2 ^g						
Meningokokken ACWY																	G1 ⁿ	bis 25. Geburtstag					
Herpes zoster																					G1 ^k /G2 ^k		
Influenza																						S (jährlich) ⁱ	
COVID-19																						S (jährlich) ⁱ	

a Zwischen April und September Geborene sollen Nirsevimab im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten; Neugeborene jeglichen Gestationsalters, die während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtseinrichtung bzw. bei der U2 (3. - 10. Lebenstag).

b Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.

c Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

d Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft.

e Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2-23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen.

f Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate.

g Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥15 Jahre oder bei einem Impfabstand von <5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich.

h Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

i Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

j Impfung mit PCV20.

k 2 Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.

l Jährliche Impfung im Herbst.

m 1-malige Impfung mit einem proteinbasierten RSV-Impfstoff im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison.

n Grundimmunisierung mit 1 Impfstoffdosis eines quadrivalenten Konjugatimpfstoffs im Alter von 12 - 14 Jahren. Nachholimpfungen bis zum Alter von < 25 Jahren.

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1-G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

mAk monoklonale Antikörper

U/J Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften / Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

Grafik erstellt nach: Robert Koch-Institut. Ständige Impfkommision: Empfehlungen der Ständigen Impfkommision (STIKO) beim Robert Koch-Institut 2026. Epid Bull 04/2026;4:1-79. 2. Robert Koch-Institut. Beschluss und wissenschaftliche Begründung der STIKO zur Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung und zum Wegfall der Basisimmunität 2026. Epid Bull 2026;28:3-30.