

Impfkalender

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Wir fürs Impfen

Impfungen	Wochen	Säuglinge und Kleinkinder (Alter in Monaten)									Kinder und Jugendliche (Alter in Jahren)						Erwachsene (Alter in Jahren)				
	6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60			
			U4		U5	U6				U7	U7a U8	U9	U10	U11 J1	J2						
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)																	
Tetanus ^b		G1		G2		G3 ^c											A1		A2		A ^e
Diphtherie ^b		G1		G2		G3 ^c											A1		A2		A ^e
Keuchhusten ^b Pertussis		G1		G2		G3 ^c											A1		A2		A3 ^e
Hib ^b Haemophilus Influenzae Typ b		G1		G2		G3 ^c															
Kinderlähmung ^b Poliomyelitis		G1		G2		G3 ^c													A1		
Hepatitis B ^b		G1		G2		G3 ^c															
Pneumokokken ^b		G1		G2		G3 ^c													S ^g		
Meningokokken C							G1														
Masern						G1		G2											S ^f		
Mumps, Röteln						G1		G2													
Windpocken ^b Varizellen						G1		G2													
HPV ^b Humane Papillomviren												G1 ^d	G2 ^d								
Herpes zoster																	G1 ^h	G2 ^h			
Grippe ^b Influenza																				S (jährlich)	

Erläuterungen

- U › Früherkennungsuntersuchung
- J › Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)
- G › Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- A › Auffrischimpfung
- S › Standardimpfung
- Empfohlener Impfzeitpunkt
- Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

- a › Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b › Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d.h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c › Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d › Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich
- e › Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- f › Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- g › Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
- h › Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- * › Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.

Quelle: Adaptiert nach Robert Koch-Institut (RKI), Epidemiologisches Bulletin 34/2020